


คำแนะนำ ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคไส้ติ่งอักเสบ



ศูนย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

โรคไส้ติ่งอักเสบ เป็นภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ที่ต้องรักษาโดยผ่าตัดเพียงวิธีเดียว
อาการเริ่มต้นมักเป็นอาการปวดท้อง ท้องอืด และจุกแน่นท้อง การวินิจฉัยโรคในระยะแรก
อาจเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือลำไส้อักเสบได้ ซึ่งอาการเริ่มแรกเหมือนกัน จึงต้องระวังว่า
ผู้ป่วยอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบระยะเริ่มต้นก็ได้ ดังนั้นหากมีอาการดังต่อไปนี้
ในหรือน้ำดอาหารไวคอนและต้องรีบกลับมาพบแพทย์ทันที

1. มีไข้สูง และปวดท้องมากขึ้น
2. ตำแหน่งปวดท้องย้ายจากใต้ลิ้นปี่ หรือปวดท้องมากบริเวณท้องน้อย โดยเฉพาะท้องน้อยด้านขวา
3. ปวดท้องน้อยข้างขวา ปวดมากขึ้นเวลาขยับตัว ปวดลดลงถ้าอ้วกอยู่เนืองๆ

หมายเหตุ

ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ซ้ำเกินไป อาจเกิดปัญหา เนื่องจากใส่ติ่งแตก ทะลุ มีการอักเสบในช่องท้อง
ทำให้การรักษาใช้เวลานาน และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้