

ผ่าตัดส่องกล้อง (MIS 3D) แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว



ศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ในปัจจุบัน มีโรคทางนรีเวชจำนวนมากที่ต้องเข้ารับการรักษาดูแลด้วยการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ ซึ่งวิธีการรักษาที่เราคุ้นเคยและใช้กันมานานคือ การผ่าทางหน้าท้อง เป็นวิธีการผ่าตัดแบบมาตรฐาน แต่อาจทำให้มีแผลใหญ่ขนาด 8-10 นิ้ว และต้องใช้เวลาพักฟื้นนานเป็นเดือน ส่วนอีกวิธีคือการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด แม้วิธีนี้จะไม่ทำให้เกิดแผลที่หน้าท้อง แต่มีข้อจำกัดมาก แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อที่ต่อการจะลดผลข้างเคียงของการรักษา ลดการบาดเจ็บ และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น จึงได้มีการนำวิธี “การผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS)” มาใช้ในการผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Surgery) เป็นการใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อการวินิจฉัย และทำการผ่าตัดภายในช่องท้อง
2. การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopic Surgery) เป็นการใช้กล้องส่องดูความผิดปกติของโพรงมดลูกโดยผ่านทางปากมดลูกเพื่อการวินิจฉัย และการทำการผ่าตัด

โรคทางนรีเวชที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง มีดังนี้

- เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myoma uteri)
- เนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor)
- ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst)
- ซีสต์โกแลตชีสต์ (Chocolate cyst)
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
- พังผืดในอุ้งเชิงกราน (Pelvic adhesion)
- ตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)
- ท่อนำไข่อุดตัน (Tubal obstruction)
- ตรวจหาภาวะมีบุตรยาก (Infertility)
- เนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Polyp, myoma)
- พังผืดในโพรงมดลูก (Uterine synechiae)
- ผนังกันกลางในโพรงมดลูก (Septate uterus)
- การทำหมันหญิง (Tubal Sterilization)
- ห่วงอนามัยทะลุเข้าช่องท้อง (Perforated IUD)
- การตัดมดลูกออกเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ (Hysterectomy)
- มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก (Early stage of Cervical cancer)
- มะเร็งรังไข่ในระยะต้น (Early stage of Ovarian cancer)
- มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer)
- เนื้องอกถุงน้ำรังไข่ ชนิดที่ไม่เป็นมะเร็งหรือซีสต์โกแลตชีสต์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางแผลผ่าตัดเล็กได้
- เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myomectomy) ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเนื้องอก สามารถผ่าตัดผ่านกล้องด้วยการใช้เครื่องมือชนิดพิเศษที่ตัดย่อยชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆ เอาออกผ่านแผลเล็กๆ และสามารถเย็บปิดโดยผ่านกล้อง

รวมทั้งกรณีที่มีข้อบ่งชี้ในการตัดมดลูก (Hysterectomy) การผ่าตัดผ่านกล้องมีวิธีให้เลือก เช่น ตัดมดลูกออกโดยเหลือปากมดลูกไว้ ตัวมดลูกจะเอาออกโดยเครื่องตัดย่อยชิ้นเนื้อ

หรือการตัดมดลูกออกพร้อมปากมดลูกโดยเอาออกทางช่องคลอด เย็บปิดโดยผ่านกล้อง

ผ่าตัดปลอดภัย
มั่นใจนครน
20 พ.ค. - 31 ก.ค. 64

- ฟรี ตรวจสุขภาพ ก่อนผ่าตัด
- ฟรี ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนผ่าตัด
- ฟรี ค่าห้องพัก
- ฟรี ดูแลส่วนลดค่ายา
- ฟรี บัตรส่วนลดสมาชิก NKT Family Club

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

*ไม่มีตรวจสวนเชิงกรานก่อนรับการผ่าตัด

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

- แผลผ่าตัดเล็ก ขนาดประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร ประมาณ 3-4 แผล
- เจ็บแผลน้อยมาก เนื่องจากความบอบช้ำจากการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิม
- พักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วัน
- ฟื้นตัวไว สามารถกลับไปทำงานหรือกิจวัตรประจำวันได้ภายใน 5-10 วัน
- ลดโอกาสเกิดพังผืดจากการผ่าตัด
- ลดความเสี่ยงของอาการแทรกซ้อนจากแผลผ่าตัด เช่น แผลอักเสบ แผลติดเชื้อ แผลเป็นหนอง เป็นต้น

ทั้งนี้ในด้านของการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดผ่านกล้องนั้น สามารถทำกิจกรรมเบาๆ ได้ภายใน 3-5 วันหลังการผ่าตัด แต่การออกกำลังกายควรรอให้ผ่านการผ่าตัดไป 1 เดือนก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพแบบออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย